

rogat

NJOHURITË
THEMELORE

t r e t m a n i

Doracak për
Zyrtarët e Shërbimit Sprovues

Letër Mbështetëse

Shërbimi Sprovues i Republikës së Kosovës është institucion shtetëror i cili funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.

Misioni i Shërbimit Sprovues të Republikës së Kosovës është, që në bazë të ligjeve ta bëjë zëvendësimin e dënimit me burg në masa alternative, që janë më humane e me dobi për vetë personin dhe shtetin.

Pra Shërbimi Sprovues i Republikës së Kosovës, merret me ekzekutimin e masave alternative, korrektimin mbikëqyrjen, risocializimin dhe riintegrimin shoqëror të personave të dënuar me masa alternative.


Një ndër detyrat kryesore të Shërbimit Sprovues të Republikës së Kosovës, është edhe ekzekutimi i dënimit me kusht me urdhër për trajtimin e detyrueshëm rehabilitues, kryesisht rehabilitimin e detyrueshëm të personave të varur nga droga dhe alkooli.

Publikimi i këtij doracakut ka qenë dhe është shumë i dobishëm për punën dhe ngritjen profesionale të Shërbimit Sprovues të Republikës së Kosovës.

Shërbimi Sprovues i Republikës së Kosovës tani është një realitet që ekziston, për të punuar, funksionar dhe përmbushur misionin e tij.

METIJE ADEMI

Drejtoreshë e Përgjithshme e Shërbimit Sprovues
së Republikës së Kosovës (SHSK)





qendra mediko-psikoterapike

LABYRINTH

Qendra Mediko-Psikoterapike "Labyrinth" është themeluar në vitin 2002 dhe merret me trajtimin dhe parandalimin e sëmundjes së varsisë nga përdorimi i drogës.

Punon në dy sektore:.

- Sektori i Parandalimit.
- Sektori i Tretmanit.

Qendra "Labyrinth" ofron këto shërbime:

- Psikoterapi individuale, grupore dhe familjare.
- Trajtimin e përdoruesve të drogës (detoksifikim ambulator, psiko-farmakoterapi).
- Këshillim për prindër dhe individë tjerë të interesuar.
- Testime të shpejta për detektim të drogës.
- KTV- (Këshillim dhe Testim Vullnetarë) për HIV/AIDS, Hepatit B dhe C.
- Trajtime psikosociale për OJQ dhe OQ.



Përmbajtja

Paraqitja e drogave në tabelë	1
Drogat, ndarja sipas efekteve	3
- <i>Kanabisi</i>	4
- <i>LSD (Lysergic Acid Diethylamide)</i>	11
- <i>Kërpudhat</i>	14
- <i>Kokaína</i>	17
- <i>Amfetamina</i>	21
- <i>Ekstazi (MDMA)</i>	25
- <i>Opiatet</i>	28
Problemet mjekësore dhe përdorimi i drogave	32
- <i>Síndromi i tërheqjes</i>	33
- <i>Mbidozimi</i>	34
Tretmani	36
Zvogëlimi i dëmit	41
Droga dhe kriminaliteti	45
Identifikimi i përdoruesit të drogës	46
Qasja	47
Fjalori	48

NDARJA E DROGAVE

KATEGORIA	LLOJI	MËNYRA E PËRDORIMIT	ORIGJINA	GJENDJA FIZIKE	VARËSIA		TOLERANCA	MBIDOZIMI	RREZIKU I ÇRREG. PSIKIKE	PËRDORIMI MJEKËSOR
					Fizike	Psikike				
HALUCINOGENET	HASHISHI	TYMOSJE+GËLLTITJE+ÇAJ	NATYRALE	NGURTE&RRESHIR	SHKALLË E LËNDE	LEHTE	★	SHKALLË E LËNDE	★	✓
	MARIHUANA	TYMOSJE+ÇAJ	NATYRALE	LULE&GJETHE	SHKALLË E LËNDE	LEHTE	★	SHKALLË E LËNDE	★	
	LSD-a	ORALE&LËKUR-ES	SINTETIKE	E LËNGËT	SHKALLË E LËNDE	LEHTE	★	SHKALLË E LËNDE	★ ★ ★	
	KËRPUDHAT (PSILOCIBIN)	GËLLTITEN&ÇAJ	NATYRALE	NATYRALE	SHKALLË E LËNDE	LEHTE	★	SHKALLË E LËNDE	★ ★	
STIMULANTET	KOKAINA	HUNDË&SHIRINGË	NATYRALE	PLUHUR&KRISTAL	LEHTE	MESME	★ ★	★ ★ ★	★	✓
	AMFETAMINA	ORALE+SHIRINGË&HUNDË	SINTETIKE	TBL+PLUHUR&KRISTAL	LEHTE	LEHTE	★ ★	★ ★	★ ★	✓
	METAMFETAMINA	ORALE+SHIRINGË&HUNDË	SINTETIKE	TBL+PLUHUR&KRISTAL	MESME	MESME	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	
	EKSTAZI (MDMA)	ORALE	SINTETIKE	TBL	LEHTE	LEHTE	★	★	★	
DEPRESANTET	OPIUMI	HUNDË	NATYRALE	NGURTE	SHKALLË E LËNDE	SHKALLË E LËNDE	★ ★ ★	★ ★	★	
	MORFINA	SHIRINGË	GJYSME-NATYRALE	LËNGËT&PLUHUR	SHKALLË E LËNDE	SHKALLË E LËNDE	★ ★ ★	★ ★ ★	★	✓
	HEROINA	INHALIM	GJYSME-NATYRALE	PLUHUR	SHKALLË E LËNDE	SHKALLË E LËNDE	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★	
	METADONI	ORALE	SINTETIKE	LËNGËT&TBL	SHKALLË E LËNDE	SHKALLË E LËNDE	★ ★	★ ★		✓

DROGAT, NDARJA SIPAS EFEKTEVE

Drogat janë substanca kimike dhe natyrore të cilat shkaktojnë ndryshime fizike dhe psikologjike. Njerëzit i përdorin ato për të ndryshuar formën e të menduarit, të ndijimit dhe sjelljen. Në bazë të efektit që shkaktojnë në organizëm, drogat ndahen në tri kategori: drogat depresante, stimulante dhe halucinogjene.

Drogat Stimulante: efekti i drogave stimulante është ngritja e aktivitetit të sistemit nervor e cila pason me rritje të përkohshme të vetëdijes dhe vigjilencës. Ky efekt varet nga lloji i stimulantëve. Në përgjithësi shkaktojnë ngritje të energjisë fizike, eufori të vullshme dhe ndjenjë të mirëqenies. Kjo kategori e drogave përfshin: amfetaminën, kokainën, ekstazinë etj.

Drogat Halucinogjene: drogat halucinogjene janë substanca që ndryshojnë perceptimet e personit ndaj realitetit. Shkaktojnë halucinacione dhe shtrembërime ndijore. Përdoruesit mund të shohin, dëgjojnë, prekin gjëra që në realitet nuk ekzistojnë. Kjo kategori e drogave përfshin: LSD, kërpudhat psilotsiake, kanabisin etj.

Drogat depresante: janë substanca që ulin aktivitetin e sistemit nervor. Kanë veprim qetësues në organizëm. Ndikojnë në uljen e funksioneve të organeve, lirimin e stresit dhe gjithashtu zbutjen e ankthit. Kjo kategori e drogave përfshinë opiatet siç janë: heroina, morfina etj.

Drogat përkundër dhënies së efekteve pozitive të përkohshme ato njëkohësisht shkaktojnë një varg efektesh afatshorë të natyrës fizike dhe psikologjike të cilat personi do t'i vuajë për një kohë të gjatë.

Varësia fizike dhe psikologjike

Varësia fizike: nënkupton ndryshimet fiziologjike që ndodhin në organizëm si rezultat i marrjes së rregullt të drogave, si rrjedhojë organizmi mësohet me prezencën e drogës dhe ndërprerja e menjëhershme e saj shkakton sindromën e tërheqjes. Kjo sindromë karakterizohet me simptoma, të cilat varen nga lloji i drogës. Simptomat tipike të tërheqjes përfshin nauzen, të vjellurit, tahikardinë, ankthe e depresion, kokëdhimbje e dhimbje trupore, pagjumësi, lëkundje të tensionit të gjakut dhe halucinacione të lehta.

Varësia psikologjike: nënkupton sjellje kompulsive apo shprehje të përdorimit të drogave për ta përmbushur nevojën psikologjike.

Përdorimi i shpeshtë i drogave shkakton tolerancën. Organizmi më nuk reagon ndaj dozave fillestare. Duhet rritur dozat e drogës për të arritur efektin e mëparshëm.

KANABISI

Përshkrimi

Kanabisi është bimë gjethore. Rritet në të gjitha viset tropikale të botës. Mund të kultivohet në fusha të hapura dhe në kushte artificiale (sera). Bima e kanabisit mund të rritet me gjatësi mbi 2 metra.


Ekzistojnë tre lloje të bimes kanabis: kanabis sativa, kanabis indica dhe kanabis ruderalis.

Marihuana, hashishi dhe vaj hashishi janë produkte të bimes kanabis sativa.



- **Marihuana:** është formë e përdorimit të kanabisit. Lulet dhe gjethet e kanabisit thahen në ambient të errët dhe pa lagështi, pastaj grimcohen dhe mbështjellën në formë cigare. Kjo formë cigare quhet „gjoint”, që e karakterizon cigaret marihuanë.

Marihuana gjen përdorim më të shpeshtë nga ana e përdoruesve sepse shkakton efekte më të dëshiruara se sa dy format tjera.



- **Hashishi:** përfitohet nga përpunimi i fletëve dhe luleve të kanabisit. Përmes procesit të thjeshtë kimik, ku nga lulja e kanabisit nxirret ekstrakti në formë rrëshire, në gjendje të ngurtë, me ngjyrë kafe të errët kah e zezë. Ky ekstrakt imtësohet dhe përzihet me cigare, e cila pastaj tymoset.



- **Vaj Hashish:** është në formë të lëngut të dendur, me ngjyrë kafe të errët. Cigarja zhytet në vaj hashish, thahe dhe tymoset.

Të tri format e përdorimit japin përafërsisht efekte të njëjta mirëpo koncentrimi i substancës psikoaktive THC është 5 herë më e madhe tek hashishi dhe vaj hashishi se tek marihuana.

Historiku i Kanabisit



Kanabisi njihet 500 vite para erës sonë. Gjatë historikut bima e kanabisit është përdorur për qëllime industriale, religjioze, mjekësore. Fillimisht nga kanabisi ishin përfituar mëlmesa për ushqim. Dihet se nga përpunimi i fibrës së kanabisit është nxjerrë konopi, rroba, rrjeta për peshkim, kurse nga farat është përfituar vaji për mbushjen e fenerëve për ndriçim. Paganët besonin se kanabisi ka fuqi hyjnore andaj e përdornin gjatë kryerjes së disa riteve pagane. Përdorimi mjekësor i kanabisit ka ardhur në shprehje gjatë kryerjes së ndërhyrjeve kirurgjike. Në mesjetë kanabisi zë të përhapet në Evropë, përmes tregtisë nga - Kina dhe më pastaj në Amerikë

Në shekullin e kaluar ka pasur një përhapje të dukshme të kanabisit në Evropë dhe Amerikë.

Shumë shënime dhe tregime mbesin në nivel të anekdotave lidhur me historinë e kanabisit.

Mendohet që edhe përralla „Llamba e Alaudinit,, ka ardhur si rrjedhojë e përdorimit të kanabisit, e cila kishte dhënë efektin e halucinacioneve dhe rritjes së fantazisë. Po ashtu ekziston rrëfimi se në Trevat Ballkanike kanabisi ishte përdorur si preparat qetësues tek fëmijët, që ballafaqoheshin me shqetësime të ndryshme. Këtyre fëmijëve ju është dhënë një lloj çaji, që supozohet të ishte kanabis. Përkundër rrëfimeve të shumta kanabisi nuk është përdorur në regjionin Ballkanik deri në fund të shekullit të kaluar.

Bima kanabis sativa në regjionin e Ballkanit është kultivuar për qëllime industriale gjegjësisht për përpunimin e tekstilit dhe konopit.

Në Kosovë, në periudhën e pas luftës, pas vitit 2000 është përhapur në masë të madhe si dhe janë gjetur fusha të mbjellura me kanabis, të cilat janë shfrytëzuar për kontrabandim.

Kualiteti i kanabisit varet nga koncentrimi i substancës psikoaktive THC në lulet dhe fletët e kanabisit. Ky koncentrim varet nga kushtet klimatike dhe përmbajtja e dheut.

Supozohet se kanabisi i rritur në Kosovë ka përmbajtje të vogël të THC, ndërsa kanabisi i rritur në jug të Shqipërisë, i njohur si „Albanika“ cilësohet si kanabis kualitativ.

Në viset shqiptare deri më tani nuk është gjetur kultivimi i kanabisit në kushte artificiale, gjegjësisht sera.

Përbërja Kimike

Përbërësit aktiv të kanabisit quhen kanabinole. Ekzistojnë disa lloje kanabinolesh që sintetizohen nga bima e kanabisit si: tetrahidrokanabinol (THC), kanabinol, kanabidiol, acid kanabinolicid dhe kanabinokromere.

THC (TetraHidroCanabinol) është përgjegjës kryesor që shkakton efektet psikoaktive të kanabisit.

Përdorimi Mjekësor

Gjatë historikut të vet kanabisi është përdorur si ilaç për shërimin e malarisë, konstipacionit (kapsllëkut), dhimbjeve reumatike dhe hutesës. Po ashtu kombinimi i hashishit me alkool është përdorur si preparat anestetik (largimin e dhimbjeve), gjatë ndërhyrjeve kirurgjike.



Të dhënat shkencore mbi përdorimin mjekësor të kanabisit janë kontraverse.

Në SHBA kanabisi edhe pse është në listën e parë të drogave të ndaluara, megjithatë ka filluar të përdoret si ilaç mjekësor që njihet si Marinol.

Marinoli është formë e sintetizuar e kanabisit. Efekti i tij është shtimi i oreksit dhe largimi i nauzës dhe vjelljes, që në mënyrë indirekte përmirëson imunitetin ose gjendjen e përgjithshme të organizmit. Marinoli mund të përsërkruhet nga ana e mjekut për personat e infektuar me virusin HIV/AIDS, nga sëmundjet kancerogjene si dhe për çrregullimet e të ngrënit që karakterizohen me humbje të madhe në peshë.

Ky ilaç merret në formë të tabletave përmes rrugës orale.

Mariuhana është produkt i kanabisit, e cila përmban me qindra përbërës kimik, që ndoshta disa prej tyre mund të jenë të dobishëm për shëndetin e njeriut. Këto supozime ende janë të pa vërtetuara. Kanabisi nuk ka përdorim të gjerë mjekësor.

Potenciali për Varësi

Përdorimi i kanabisit për një kohë të gjatë mund të shkaktoj shprehje psikologjike tek disa përdorues, të cilët ballafaqohen me vështirësi për ta ndërprerë.

Studimet kanë treguar se 5-10% të atyre që provojnë kanabisin mund të shëndërrohen në përdorues të përditshëm të tij. Shumica e tyre heqin dorë nga përdorimi i kanabisit kah moshë 30 vjeçare, kurse disa mbeten përdorues të përditshëm deri pas moshës 40 vjeçare.

Shumica e tyre nuk përstojnë shenja të varësisë fizike. Simptomat e lehta deri tek ato të mesme të tërheqjes paraqiten pas një jave të ndërprerjes dhe mund të zgjasin deri në gjashtë javë. Megjithatë nuk janë simptome dramatike.

Doza

Efekti i kanabisit varet nga lloji dhe koncentrimi i THC-s. Disa lloje janë të njohura si „one-hit-shit,, - mjafton një mbushje e mushkërive për të arritur efektin e plotë, përderisa disa lloje tjera kërkojnë disa thithje për të arritur efektin e njëjtë.

Efekti i kanabisit varet nga struktura psikologjike, gjendja emocionale e personit dhe rrethanat në momentin e përdorimit të tij.

Përdorimi i rregullt i kanabisit mund të shkakton vështirësi funksionale në sistemin e frymëmarrjes, kollitje, rritje e infeksioneve në mushkëri dhe fyt etj.

Përdorimi për një kohë të gjatë i kanabisit dhe marrja me doza të larta mendohet se jep efekte kancerogjene. Megjithatë këto supozime janë të pa vërtetuara.

Mbidozimi

Nuk ka prova ose publikime për vdekje nga mbidozimi me kanabis. Një numër i vogël i përdoruesve raportojnë për alergji serioze nga përdorimi i kanabisit. Këto alergji manifestohen me reaksione të papritura dhe iritime në sistemin e frymëmarrjes.

Sëmundjet e Zemrës

Kanabisi mund të shkaktoj çrregullime në ritmin e zemrës. Më të rrezikuar janë ata përdorues që vuajnë nga sëmundjet e zemrës dhe personat e moshës së shtyer. Është vërtetuar se vdekjet nga kanabisi janë shumë të rralla.

Sëmundjet Mendore

Disa studime kanë treguar se përdorimi i kanabisit mund t'i nxisë neurozat. Më të rrezikuar janë personat që kanë predispozita për çrregullime të caktuara mendore.

Mirëpo studimet tjera kanë treguar se përdorimi i kanabisit nuk shkakton çrregullime mendore tek individët me stabilitet mendor.

Aspekti Ligjor

Kanabisi edhe pse konsiderohet si drogë e lehtë, megjithatë në të gjitha vendet e botës është drogë ilegale. Në dekadën e fundit të shekullit të kaluar është bërë një lëvizje e madhe botërore për legalizimin e Marihuanës / Kanabisit.

Mirëpo viteve të fundit, gjithnjë e më shumë, legjislacionet pozitive shprehen fuqishëm kundër legalizimit të kanabisit.

Përkrahësit e prohibicionit të kanabisit mbështeten në të dhënat statistikore dhe praktikë, se personat e varur nga droga, kryesisht kanë filluar me përdorimin e kanabisit.

Ky konstatim është nxjerr nga hulumtimet dhe eksperimentet, që janë bërë në nivel botëror.

Disa shtete kanë bërë hapin e gjysmëlegalizimit të Marihuanës.

Kjo lëvizje njihet si dekriminalizim. Holanda është vendi i parë që ka bërë dekriminalizimin e kanabisit dhe atë vetëm në vende të caktuara gjegjësisht në „Coffe Shop” kurse përdorimi i tij jashtë këtyre vendeve është i ndaluar.

Në disa vende të Evropës dhe Amerikës është lejuar prodhimi dhe kultivimi i kanabisit për qëllime industriale dhe mjekësore.

Në Kosovë përdorimi, kultivimi dhe shitja e kanabisit është e ndaluar.

Lista e Efekteve të Kanabisit

Kanabisi shkakton efekte më të lehta krahasuar me substancat tjera psikoaktive-ekreative. Kryesisht nën ndikimin e kanabisit, njerëzit shfaqin sjellje normale dhe funksionojnë normalisht në aktivitetet e përditshme.

Efektet Pozitive:

- Disponim i shtuar, eufori (gjendje emocionale që lidhet me përjetim të intensitetit të shtuar të kënaqësisë).
- Të qeshura edhe pa ndonjë arsye,
- Relaksim, ulje e stresit,
- Të menduar kreativ, filozofik dhe i thellë, idetë rrjedhin lehtë,
- Rritet ndjeshmëria për mundësinë e një lidhje me të thellë ndaj saj,
- Ndjeshmëri e rritur e shqisës së nuhaturit,
- Ndryshim në përjetimet trupore, me rritje të lidhshmërisë mendje trup,
- Zvoglim i dhimbjeve të kokëdhembjes, dhimbjes së barkut etj.),
- Appetit i shtuar për të ngrënë dhe për të pirë,
- Aktivitetet e përditshme janë më pak të mërzitshme nën ndikimin e kanabisit.

Efektet Neutrale:

- Ndryshime të përgjithshme të vetëdijes (sikurse te shumica e substancave psikoaktive)
- Ngadalësim në të folur dhe lëvizje,
 - Mprehtësi e shtuar ndaj ngjyrave dhe dritës,

- Molisje, kllapí, përgjumje,
- Pamundësi për te fjetur (flejnë shumë pak)
- Skuqje e syve,
- Tharje e gojës, ngjytje dhe shtangim i saj,
- Probleme me kujtesë. Vështëresí për ti kujtuar detajet e ngjarjeve,
- Paturpësi dhe arrogancë,
- Shtangim ose mpírje në nofull dhe fytyrë. Mpírja është më pak e zakonshme,
- Fluks mendimesh në të njëjtën kohë,
- Humbje e sensit për kohën. Koha ecën shumë shpejtë ose shumë ngadalë.

Efektet Negative:

- Nauzea (ndjenja e vjelljes), sidomos kur kanabisi kombinohet me alkool ose me disa substanca farmaceutike dhe psikoaktive,
- Kollitje, probleme në frymëmarrje, astma,
- Problemet në kujtesën afatshkurtër vijnë në shprehje gjatë efektit dhe përdorimit të shpeshtë të kanabisit,
- Ritëm i shpejtuar i zemrës, agjitacion ose ndjenjë e të qenurit në tension,
- Ankthiozitet i shtuar (frikë dhe tension),
- Sulmet e panikut ndodhin si rezultat i përdorimit të dozave të larta. Këto sulme më të shprehura janë tek personat me ndjeshmëri të lartë emocionale,
- Marramëndje dhe konfuzion,
- Molisje, humbje e ekuilibrit, sidomos tek marrja e dozave të larta,
- Mendime të shtuara paranoike,
- Varësia psikologjike mund të vijë edhe nga kanabisi, megjithëse është e formës së lehtë,
- Mund të keqësoj ose acaroj çrregullimet mendore ekzistuese.

Símtomet e Abstenences(tërheqjes)

Ndërprerja e menjëhershme e përdorimit të kanabisit mund të shkakton símptomet e tërheqjes prej shkallës së lehtë kah ajo e mesme. Símtomet e tilla mund të paraqiten 1 deri në 6-shtë javë pas ndërprerjes së përdorimit të kanabisit.

Símtomet e tërheqjes manifestohen me ankth, anhedoni (ulje e përjetimit të kënaqëisë), kokëdhëmbje, shqetësim të përgjithshëm ose paresthi, vështirësi për të fjetur, humbje ose zvogëlim i dëshirës për të ngrënë, ndjenjë e lodhjes dhe pasivitetit, monotoni e madhe dhe dëshirë për të përdorur përsëri marihuanë.

Intensiteti i këtyre símptomeve varet nga doza, shpeshtësia, kohëzgjatja e përdorimit të kanabisit dhe nga struktura psikologjike e personalitetit të përdoruesit.

www.rapitfulshqip.com

LSD (Lysergic Acid Diethylamide)

Përshkrimi

LSD është njëra ndër substancat psikodelike ose halucinogjene. Mund të gjendet në forma të ndryshme. Më së shumti gjendet në formë të letrës së thithëse (letër e dekoruar me pamje artistike). Kjo letër thithëse zhytet në lëngun tretës të LSD dhe thahet për përdorim.

Gjendja e zakonshme e LSD-së është e lëngët por mund të gjendet dhe në formë të pluhurit, tabletave, tabakëve xhelatinë në forma të ndryshme.

LSD përdoret përmes rrugës orale dhe poreve të lëkurës. Përdorimi i LSD-së përmes letrës thithëse është më i shpeshtë sepse është më lehtë për të prodhuar dhe fshehur nga policia. Kjo letër mundëson thithjen edhe të substancave tjera shtesë.

Historiku

LSD së pari është sintetizuar në vitin 1939 ndërsa efekti i saj psikoaktiv është zbuluar në vitin 1943. Popullariteti i LSD-së rritet me Lëvizjen Hipike në vitet e 60-ta. Në vitin 1967 bëhet drogë ilegale dhe që nga ajo kohë gjetja e saj për përdorim ka qenë e mundur vetëm në tregun e zi.

Në këtë kohë LSD përhapet edhe në Evropë, ndërsaq popullariteti i saj riaktualizohet në vitet e 90-ta.

LSD në Kosovë ka filluar të përhapet rreth viteve 2003-2004.

Aspekti Ligjor

LSD është ilegale në të gjitha vendet e botës. Gjendet e radhitur në listën e parë të substancave psikotrope.



LSD (Lysergic acid diethylamide) është një substancë kimike, sintetike. Nxirret nga Ergo alkaloidet të cilat janë prodhuar nga Ergo kërpudhat që zhvillohen në thekër.

Potenciali për Varësi

LSD nuk shkakton varësi fizike dhe as simptome të tërheqjes tek shumica e përdoruesve megjithatë nëse përdoret për një kohë të gjatë dhe me sasi të mëdha mund të shkaktoj shprehë psikologjike.

Përdorimi i shpeshtë i LSD-së shkakton tolerancën. Nëse përdoret dy apo më shumë ditë radhazi mund të shkaktoj tolerancë që nënkupton se përdoruesi duhet shtuar dozen e përdorimit për të arritur efektin e mëparshëm.

Dëmtimet Shëndetësore

Përdoruesit e LSD-së ballafaqohen me vështirësi gjatë kryerjes së aktiviteteve të përditshme.

LSD është e njohur në nxitjen e çrregullimeve mendore dhe problemeve psikologjike. Më të rrezikuar janë ata përdorues që kanë predispozita trashëguese për çrregullime mendore. Tek përdoruesit e paqulibruar në aspektin mendor, përdorimi vetëm njëherë i LSD-së mund të shkaktoj epizode psikotike dhe psikoza të përhershme.

Lista e Efekteve të LSD

Efektet Pozitive:

- Ngrit energjinë (stimulon sistemin nërvor),
- Ngrit asociacionet dhe të menduarit krijues,
- Ngrit disponimin,
- Rrit vetëdijën dhe ndjeshmërinë ndaj muzikës,
- Ngrit ndjeshmërinë e shqisave (të urisë, etjes dhe nuhatjes),
- Ndryshim i thellë i përjetimeve shpirtërore.

Efektet Neutrale

- Ndryshime të përgjithshme të vetëdijes (sikurse shumica e substancave psikoaktive),
- Zgjerim të bebëzave të syrit,
- Vështirësi për ta përqëndruar vëmendjen,
- Rrit tajimin e pështymës (shton kollitjen tek disa njerëz),
- Përjetime të pazakonta trupore, që manifestohen me skuqje në fytyrë, të dridhura, lëvizje me hope),
- Të menduar dhe të folur të pazakontë,
- Ndryshime në perceptimin e kohës,
- Ndërrim i menjëhershëm i emocioneve (gëzim me të qeshura, marramendje, ankth, zemërim, kënaqësi, iritim etj.)
- Ngritje e lehtë e temperaturës trupore,
- Rritje e lehtë e të rrahurave të zemrës

Efektet Negative

- Ankth,
- Megalomania (deluzion i madhështisë),
- Paranoja (mos besim ekstrem ndaj të tjerëve),
- Frikë dhe panik,
- Ndjeshmëri dhe përqendrim i shtuar i vëmendjes ndaj muzikës dhe zhurmës,
- Marramendje, konfuzion,
- Nauzea (ndjenja e vjelljes),
- Tendosje, shtrëngim në nofull,
- Djerësitje e shtuar,
- Përjetime të padëshiruara dhe të papërballueshme – „Trip i keq“
- Flashback (rikthim i efektit të LSD-së pas një kohe të ndërprerjes së përdorimit).



KËRPUDHAT PSYLOCIBIN

Përshkrimi

Ekzistojnë qindra lloje të psilocibinit apo kërpudhave magjike. Efekti i gëlltitjes së tyre i ngjan efektit të shkurtër të 'tipit' të LSD (shprehje e përjetimeve nën ndikimin e drogës), i cili shkakton ndryshime të theksuara fizike dhe perceptuale. Gatit të gjitha kërpudhat që përmbajnë psilocibin janë të vogla dhe lehtë mund të përzihen me kërpudhat tjera helmuese. Karakteristikë dalluese e kërpudhave që përmbajnë psilocibin është se ato mavijosen ose nxihen kur preken me dorë.

Kërpudhat psilocibin rriten më së shumti në SHBA dhe kultivohen për qëllime rekreative.

Historiku i Kërpudhave

Kërpudhat Psilocibin janë përdorur qindra vite më parë nga ana e Amerikanëve Vendas në Amerikën Qëndrore dhe Jugorë. Shënime të para në Evropë datojnë nga shekulli i 16, të shkruara nga një prift spanjoll, i cili ka shkruar për Astekët (grup etnik në Meksikë), të cilët kanë përdorur kërpudha psilocibin dhe pejote. Pejotet janë një lloj kaktusi, të cilat përmbajnë psilocibin dhe kanë veprim të ngjashëm me kërpudhat Psilocibin.

Psilocibini, përbërësi aktiv i kërpudhave, është izoluar në vitet e 60-ta dhe është përdorur për qëllime rekreative. Në vitin 1968 kërpudhat psilocibin bëhen ilegale në SHBA dhe më vonë në të gjitha shtetet.

Përbërja Kimike

Efekti kryesor i kërpudhave vjen nga përbërja e alkaloidëve të ndryshme aktive si psilocibin, psilocin etj.

Psilocibini është komponent më i qëndrueshëm sesa psilocini. Pas gëlltitjes psilocibini shëndërrohet në psilocin.

Potenciali për Varësi

Përdorimi i kërpudhave nuk shkakton varësi fizike e as psikologjike. Shumica e përdoruesve tregojnë se pas një kohe të përdorimit të kërpudhave ulet dëshira për të përdorur përsëri. Zakonisht njerëzit i përdorin kërpudhat psilocibin për qëllime rekreative,



Përdorimi i kërpudhave psylocibin mund të shkaktoj tolerancën e shkallës së lehtë.

Problemet Shëndetësore

Më të rrezikuar janë ata përdorues që kanë predispozita trashëguese për çrregullime mendore sepse psylocibini i nxitë çrregullimet psikologjike latente ose ekzistuese.

Lista e efekteve të Kërpudhave Psylocibin:

Efektet Pozitive:

- Disponim i shtuar, euforia,
- Të qeshura nën hundë,
- Të menduar të thellë krijues, filozofik – idetë rrjedhin lehtë,
- Aktivitetet e përditshme bëhen më tërheqëse dhe më interesante nën ndikimin e kërpudhave psylocibin,
- Ndjeshmëri e madhe,
- Ndryshim i përjetimeve shpirtërore,
- Habi e madhe,
- Ndjenjë paradoksale e gjëndjes normale,
- Vigjilencë e shtuar,
- Ulje e episodeve të kokës hembjes.

Efektet Neutrale:

- Ndjeshmëri e lartë emocionale,
- Ndryshime të përgjithshme të vetëdijes (sikurse te shumica e substancave psikoaktive)
- Ndryshim në perceptimin e kohës. Koha duket se kalon shumë ngadalë (minutat duken orë),

- Ndjeshmëri ndaj dritës, xixëlluesit dhe ylberi duken për rreth pikës së vogël të dritës.
- Pamje me sy mbyllur (sidomos te dozat e mesme ose të larta)
- Pagjumësi, letërgji,
- Zgjerim i bebëzave të syrit,
- Ushtrimë në kokë.

Efektet Negative:

- Përjetim i frikës me intensitet të lartë,
- Kokëdhembje si pasojë e shuarjes së efektit,
- Nauzea, gazra dhe iritim në traktin e tretjes dhe të zorrëve veçanërisht kur kërpudhat hahen pa u përgatitur (të gjalla),
- Ankth i lehtë deri të ai i shkallës më të rëndë,
- Marramendje, konfuzion,
- Alivanosje (në rast të uljes së tensionit të gjakut),
- Shkëputje e funksionit të hujtësës (ulë aftësinë për të kryer detyrat, të cilat kërkojnë kujtesë dhe vëmendje të vazhdueshme).

KOKAINA

Përshkrimi

Produkti i pastër i kokainës gjendet në formë të pluhurit të trashë më ngjyrë të bardhë, e ngjashme me kripën. Ngjyra e kokainës varet nga përzierja e saj me substanca tjera, si me sodë bikarbonate, stimulantë etj.

Kokaina gjendet në tri forma :

- **Sulfat-Kokaina:** në një vaskë më ujë të përzier me acid sulfurik dhe tretës aromatik vendosen gjethet e bimës Koka. Gjethet e copëtuara dhe të zbutura ndrydhen duke formuar një masë në formë qulli e quajtur Sulfat Kokain.

- **Freebase:** është forma bazë e kokainës, e kundërt me kokainën në formë kripe. Freebase kokaina nuk është e tretëshme në ujë dhe është e papërshtatshme për injektum. Freebase është mënyrë e përgatitjes përmes procesit të djegies me eter të kokainës në formë pluhuri ku nga baza e saj lirohen substancat psikoaktive të cilat thithen përmes tymosjes. Është formë më e shpeshtë e përdorimit sepse absorbohet shpejtë në gjak dhe për disa sekonda vepron në tru.

- **Crack -Kokaina:** është formë e ngurtë e kokainës. Mban emrin "crack" për shkak të tingullit që liron gjatë shtypjes së gurëve të vegjël. Crack formohet me përzierjen e kokainës me sodën bikarbon dhe me sasi të vogla të ujit. Gjatë nxehjes së kësaj përzierje formohen gurët e vegjël të crack kokainës. Crack përmban 75 % të kokainës. Mund të përdoret përmes nухatjes dhe tymosjes.

Historiku

Bima e kokës është përdorur mijëra vite më parë nga ana e Inkëve, fis në Amerikën Jugore. Ata kanë kultivuar bimën e kokës ku e kanë përdorur për përtypje dhe gjatë kryerjes së disa ritualeve fetare. Gjatë përtypjes nga gjethet janë liruar disa materie ushqyese dhe alkaloidi i kokainës, që ka ndikuar në shuarjen e urisë dhe uljen e ndjenjës



Emri kimik i kokainës është Benzoylmethyl Edckogine. Kokaina ka formë të pluhurit të kristaltë me ngjyrë të bardhë, pa erë dhe me shije të hidhur.

Problemet Shëndetësore

Kokaina që shitet në rrugë është mjaftë e papastër. Injektimi intravenoz i kokainës së papastër mund të shkaktoj vdekjen.

Përdorimi i kokainës përmes nuhatjes shkakton ngushtimin e enëve të gjakut në hundë dhe si pasojë e mos furnizimit të mjaftueshëm me oksigjen vjen deri te dëmtimi i indeve me ç'rast rritet shkalla e infeksioneve në mukozën e hundës. Po ashtu mund ta shkaktoj plasaritjen e septumit (struktura e butë, e cila ndan vrimat e hundës).

Tymosja e kokainës po ashtu shkakton dëmtime të rënda në sistemin e frymëmarrjes.

Injektimi intravenoz rrit rrezikun për marrje të infeksioneve të ndryshme si pasojë e shkëmbimit të gjilpërave midis përdoruesve të drogës.

Përdorimi i kokainës zvogëlon oreksin që përcillet me humbje në peshë.

Përdorimi i kokainës rrezikon lindjen e parakohshme të fëmijut tek gratë shtatëzëna.

Mund te përcillet te fëmija përmes ushqimit me gjí. Kjo shkakton iritueshmëri dhe humbje të oreksit të fëmijës.

Potenciali për Varësi

Kokaina ka potencial të lartë për të shkatuar varësi psikologjike. Mendohet se varësia fizike nuk mund të vij nga përdorimi i kokainës.

Përdorimi për një kohë të gjatë i kokainës dhe me doza të larta paraqet vështëresí shumë të mëdha për ta ndërprerë.

Përdorimi fillestar i kokainës me doza të larta shkakton tolerancën rapide. Përdoruesit duhet shtuar dozën për ta arritur efektin e mëparshëm.

Aspekti Ligjor

Kokaina është drogë ilegale në të gjitha vendet e botës.

- Rrit vigjilencën,
- Ngrit disponimin,
- Euforia,
- Rrit performancën sportive,
- Zvoglon lodhjen,
- Pastron mendimet,
- Rrit vemendjen,
- Rrit energjinë,
- Rrit iritueshmërinë,
- Insomnia (pagjumësia),
- Shqetësim trupor,

Përdorimi i kokainës me doza të larta mund të shkakton Kokainë psikozën, e cila manifestohet me gjendje depresive, iritueshmeri, frikë, paranoja, "halucinacione". Personat nën ndikimin e kësaj psikoze shfaqin sjellje agresive dhe asociale.

Efektet Fizike:

- Rrit të rrahurat e zemrës,
- Rrit tensionin e gjakut,
- Rrit temperaturën e trupit dhe djersitjen.
- Rrit ritmin e frymëmarrjes,
- Bën zgjerimin e bebëzave të syrit,
- Ulë oreksin dhe gjumin,
- Rritja në shkallë të lartë e tensionit të gjakut mund të shkaktoj pëlçitjen e mureve të dobëta të enëve të gjakut në tru. Mund të viejë deri te gjakderdhjet në tru.

Edhe pse besohet se kokaina nuk shkakton varësi fizike, mospërdorimi i rregullt i saj paraqet shfaqjen e simptomëve të theksuara të tërheqjes dhe dëshirës së madhe për të përdorur përsëri.

Simptomet e tilla janë:

- Dëshirë e parezistueshme për të përdorur përsëri kokain,
- Uri e madhe,
- Iritueshmëri,
- Apati,
- Depresion,
- Paranoja,
- Ide për vetvrasje,
- Humbje e dëshirës seksuale,
- Çrregullime të gjumit (nuk flejn fare ose flejn shumë),
- Marramendje,
- Dridhje,
- Ndjenjë e të ftohtit,

Simptomet e tërheqjes nga kokaina nuk janë të fuqishme krahasuar me opiatet, megjithatë përdoruesit ballafaqohen me mjaft pakënaqësi. Përdoruesit shpesh marrin kokainë për t'i zvogluar këto simptome, e cila mund të shndërrohet në shprehje, varësi psikologjike.

Simptomet e Mbidozimit:

Marrja e kokainës me doza të larta shkakton mbidozimin, i cili manifestohet me agjitacion, armiqësi, halucinacione, konvulzione (ngërçe), hipertemi (rritje e temperaturës trupore), sulme në zemër deri në vdekje të mundshme.

Më të rrezikuar për vdekje janë ata përdorues që kanë probleme me zemër dhe tension të lartë të gjakut.



AMFETAMINA

Përshkrimi

Amfetamina është emër që i dedikohet grupit të stimulantëve sintetik, që kanë përmbajtje të ngjashme me adrenalinen. Adrenalina është hormon që ndikon në rritjen e funksionit të organeve në organizëm.

Ekzistojnë tri tipe të amfetaminës:

1. 'Speed' - Amphetamin sulfat (e njohur me emrin Benzedrine).
2. Dextroamphetamine (Dexedrine) dhe
3. Methamphetamine (Methedrine)

Amfetamina e pastër është në formë kristali. Mund të gjendet edhe në formë të pluhurit të trashë me ngjyrë të bardhë kah e verdhë dhe në gjendje të lëngët. Forma e Amfetaminës me veprim më të fortë është met-amfetamina e lëngët, e cila injektohet në mënyrë intravenoze. Amfetamina zakonisht gjendet në formë të tabletave dhe kapsulave. Kjo drogë mund të merret përmes njuatjes, tymosjes, injektimit intravenoz dhe përmes rrugës orale.

Historiku

Amfetamina për herë parë është sintetizuar nga kimisti gjerman Ledeleano në vitin 1887. Amfetamina fillimisht është njohur si Benzedrine, ilaç që përshekruhej për trajtimin e kongestionit, narkolepsisë (gjumë i shtuar gjatë ditës) dhe çrregullimit të vëmendjes dhe hiperaktivitetit.

Gjatë Luftës së Dytë Botërore miliona tableta Amfetamin u janë shpërndarë ushtarëve, që të rrinin zgjuar dhe vigjilent.

Ndikimi

Pas përdorimit të Amfetaminës fillojnë gudulisjet në stomak, me vërsulje përpara. Rritet vigjilenca dhe përqëndrimi i vëmendjes. Më pas fillon kërcitja e dhëmbëve dhe shtrëngimi i nofullës.



Përdorimi i amfetaminës për një kohë të gjatë shkakton dërmimin e dhëmbëve, pasi përdoruesit vazhdimisht i brejnë dhëmbët.

Nën ndikimin e Amfetaminës përdoruesit ndihen shpirtërisht të lumtur dhe të sigurtë. Ju shtohet dëshira për të folur me të tjerët. Flasin pandërprerë dhe pa kuptim.

Aspekti Ligjor

Amfetamina hynë në listën e dytë të substancave psikotrope. Ka përdorim mjekësor të kontrolluar.

Simptomet e Tërheqjes

Amfetamina ka potenciale për të shkaktuar tolerancë. Ndërprerja e menjëhershme e përdorimit të Amfetaminës shkakton paraqitjen e simptomeve të tërheqjes, të cilat manifestohen me lodhje të madhe, çrregullime të gjumit, iritueshmëri, uri e madhe dhe depresion prej shkallës së mesme kah e rëndë. Ky depresion varet nga kohëzgjatja, shpeshtësia dhe mënyra e përdorimit të Amfetaminës.

Simptomet e Tërheqjes janë :

- Mallëngjim,
- Depresion,
- Rraskapitje,
- Konfuzion mendor,
- Nervozizëm dhe insomni (pagjumësia),
- Gjumë i çrregulluar ose i thellë, që zgjatë deri në 48 orë,
- Uri e madhe,
- Reaksione psikotike dhe anksioze.

Varësia

Përdorimi i amfetaminës për një kohë të gjatë mund të shkaktojë të ashtuquajturën Amfetamin psikozë, lloj specifik i psikozës, e ngjashme me

skizofreni paranoike. Amfetaminë psikoza manifestohet me halucinacione, deluzione dhe paranoja.

Nën ndikimin e kësaj psikoze personat shfaqin sjellje të çuditshme dhe shpesh të dhunshme.

Símtomet e Amfetaminë psikoze zakonisht tërhiqen brenda pak javësh, pas ndërprerjes së përdorimit të amfetaminës.

Efektet e Amfetaminës

Efektet Pozitive:

- Vigjilencë e rritur,
- Motivim i shtuar,
- Dëshirë e madhe për të folur, përdoruesit bëhen llafazan,
- Ndërrim pozitiv i gjendjes emocionale, ndjenjë e mirëqenies dhe rehatisë.

Efektet neutrale:


- Zvogëlon dëshirën për të ngrënë (anoreksia),
- Bebzëa të zgjeruara të syve,
- Ngazëllim, vrull,
- Humbje e drejtpeshimit,
- Tharje e gojës,

Efektet Negative

- Rrit agresivitetin,
- Paranoja,
- Kokëdhembje,
- Nervozizem, shqetësim.

- Shpejton ritmin e frymëmarrjes,
- Rrit tensionin e gjakut,
- Ngrit temperaturën e trupit,
- Ëthe dhe djersitje,
- Barkqitje dhe kapsllëk,
- Shikim i turbulltë,
- Vështësi për të folur,
- Marramendje,
- Lëvizje të pakontrolluara, dridhje e trupit,
- Insomnia (pagjumësia),
- Mpirje e muskujve ,
- Çrregullon rrahjet e zemrës (palpitacionet, aritmi),
- Impotenca (tek përdoruesit kronik),
- Konvulziona (ngërqe -te dozat e larta),
- Tharje dhe iritim i lëkurës (tek përdoruesit kronik),
- Akne dhe pezmatime në lëkurë (tek përdoruesit kronik),
- Zbehje (tek dozimi i lartë dhe tek përdoruesit kronik),
- Episode psikotike (te mbidozimi dhe përdorimi kronik).

www.rapitullshqip.com



EKSTAZI

Përshkrimi

MDMA është drogë stimulante dhe psikodelike. Në rrugë njihet si ekstazi. Përdorimi i saj shkakton ndjenjë të fortë të komfortit, empatisë dhe krijimit të lidhjeve me të tjerët. Zakonisht gjendet në formë të tabletave që kanë formë, ngjyrë dhe emërtime të ndryshme. Kryesisht përdoret përmes rrugës orale dhe rrallë përmes formave të tjera.

Historiku

MDMA së pari është sintetizuar në vitin 1895 ndërsa me 1912 është patentuar nga "Merk" – (fabrikë e njohur farmaceutike), ku më pas është bërë e njohur përmes mediave të shkrimit.

Ekstazi fillimisht është përdorur me të madhe nëpër klube vallëzimi nëpër botë. Historiku i saj është i lidhur ngushtë me kulturën „Rave„ ku është përzgjedhur me muzikë elektronike nën shoqërimin e dritave ndriçuese shumëngjyrëshe. Përdorimi i ekstazisë për qëllime rekreative është aktual edhe sot.

Në vitet e 70-80-ta, ekstazi është përdorur si mjet psikoterapeutik nga ana psikologëve, me qëllim të krijimit të empatisë me të tjerë tek klientët. Klientët nën ndikimin e saj janë shprehur më lirshëm për përvojat e tyre emocionale gjatë procesit terapeutic.

Popullariteti i ekstazisë arrihet në vitin 1985 në SHBA, ku po në këtë vit ekstazi njihet si substancë ilegale dhe që atëherë gjëja e saj është e mundshme vetëm në treg të zi.

Përbërja Kimike

MDMA (MethyleneDioxy-N-MethAmphetamine) është substancë kimike e sintetizuar. Përfitohet nga vaji esencial i bimës sasafras.

Bima sasafras karakterizohet me degë të holla, të buta, me lëvore ngjyrë portokalli kah ngjyra kafe. Mund të rritet në gjatësi deri në 15 – 35 m. Të gjitha pjesët e bimës sasafras janë aromatike.



Ekstazi mund të shkaktoj varësi psikologjike. Personat që vazhdimisht përdorin ekstazi, kanë dëshirë të madhe për ta përdorur përsëri. Përdorimi i saj për një kohë të shkurtër (dy ose më shumë ditë radhazi) mund të shkaktoj tolerancën. Përdoruesi duhet shtuar dozën e përdorimit për ta arritur efektin e mëparshëm.

Aspekti Ligjor

MDMA është drogë ilegale në të gjitha vendet e botës. Është e radhitur në listën e parë të substancave psikotrope.

Lista e Efekteve të Ekstazisë

Efektet Pozitive:

- Ndërrim i shpejtë, pozitiv i gjendjes emocionale,
- Shton dëshirën dhe vullnetin për të komunikuar me të tjerët,
- Rrit energjinë,
- Zbutje e UNI-t,
- Ndjenjë e rehatisë dhe afërsimit me të tjerët,
- Ndjejnë dashuri dhe empati për të tjerët,
- Falin lehtë,
- Rrit ndjeshmerinë për muzikën,
- Rritet ndjeshmëria ndaj ndijimeve (e urisë, etjes dhe e nihatjes),
- Përjetime të theksa shpirtërore,
- Dëshirë e madhe për t'i përqafuar të tjerët.

Efektet Neutrale:

- Humbje e oreksit,
- Shtrembërime pamore,
- Lëvizje e shpejtë dhe e pavullnetshme e syve,
- Halucinacione të lehta pamore,

- Rritje e ritmit të zemrës dhe tensionit të gjakut (sidomos tek përdorimi i sasive të mëdha),
- Shqetësim, nervozizem, dridhje,
- Ndryshim në rregullatorin e temperaturës trupore,
- Shpërthim emocional, joqëndrueshmeri emocionale,
- Dëshirë dhe dashje e madhe për të përdorur përsëri ekstazi.

Efektet Negative

- Lidhje emocionale të papërshtatshme ose të padëshiruara me të tjerët,
- Tendencë për të thënë, gjëra për të cilat pastaj pendohen,
- Shtrëngim i muskujve të nofullës dhe përçapje e gjuhës dhe kercitje e dhëmbëve,
- Vështirësi për tu marrë me aktivitete të cilat kërkojnë përqendrim të vazhdueshëm të vëmendjes,
- Humbje e kujtesës afatëshkurtër dhe konfuzion,
- Tension muskular (tendosje e muskujve),
- Çrregullim në ereksion dhe vështërsi për ta arritur orgazmën.
- Rritje e temperaturës trupore, hiperemji (kuqie e lëkurës së trupit), dehidrim (harxhim i lëngjeve trupore e cila karakterizohet me etje të shtuar),
- Nauze (ndjenjë e vjelljes) dhe vjellje,
- Kokëdhembje, marramendje, humbje e drejtëpeshimit,
- Dëshpërim i thellë, ndjenjë e humbjes, nostalgji e madhe,
- Depresion dhe lodhje të gjatë me ditë,
- Mund të shfaqen edhe krizat psikologjike, të cilat kërkojnë hospitalizim (epísode psikotike, sulme të rënda paniku etj),
- Është i mundshëm edhe toksiciteti i mëlqisë,
- Vdekja nga ekstazi është e rrallë. Përafërsisht 2 nga 100,000 përdorues mund të vdesin nga mbidozimi me ekstazi.

(Efektet anësore ose negative të ekstazisë rriten në përputhshmëri me dozimin e lartë dhe shpeshtësinë e përdorimit).



OPIATET

Përshkrimi

Opiatet janë grup i drogave depresante, të cilat shkaktojnë uljen e aktivitetit të Sistemit Nervor. Efektí kryesor i tyre është zvogëlimi i dhimbjeve në organizëm. Opiatet janë përdorur me qindra vite më parë për shkak të efektit euforik si dhe analgjetik. Po ashtu janë përdorur për arsye rekreative dhe religjioze. Në fund të shekullit të XIX-të dhe në fillim të atij XX, shkencëtarët kanë sintetizuar morfinën nga opiumi dhe me vonë nga morfina është sintetizuar Heroína. Kjo është koha që shënon fillimin e shfaqjes së problemit të varësisë si epidemiologji.

Opiatet gjenden në disa forma :

- **OPIATE NATYRORE:** janë alkaloidë të cilat nxirren nga boqa e njomë e bimës Opium Poppy. Këtu bëjnë pjesë morfina, kodeina etj.
- **OPIATE GJYSMË-SINTETIKE:** këto krijohen nga opiatet natyrale. Opium gjysmë sintetik është heroína etj.
- **OPIATE SINTETIKE:** janë pentanoli, pethedine dhe metadoni.
- **OPIATET ENDOGENE:** Këtu hynë endorfinat dhe endomorfina. Drogat endogjene prodhohen nga vetë organizmi i njeriut. Roli i tyre në organizmin tonë është zvogëlimi i dhimbjeve trupore. Po ashtu luajn rol të rëndësishëm në rregullimin e ekuilibratit të trupit.

Kur njerëzit përdorin opiate, ata marrin sasi që janë shumë më të larta se sa niveli i tajimit normal të endorfinave. Kjo sasi e tepërt shkakton bllokimin dhe çrregullimin e funksionimit të tajimit të endorfinave.

Përdorimi i opiateve për një periudhë të gjatë kohore e bën organizmin që ti adaptohet dozave shumë të larta të opiateve dhe ndërprerja e menjëhershme e përdorimit të tyre shkakton simptomet e tërheqjes, të cilat janë të njohura si **Kriza**.

Përdorimi fillestar i opiateve shkakton kënaqësi, ndjenjë të mirqënies, rehatisë dhe komfortit psikik, që i shtyn personat të përdorin përsëri me qëllim të përsëritjes së përjetimit të mëparshëm. Mirëpo organizmi adaptohet me prezencën e drogës

dhe nuk i mjaftojnë më dozat fillestare (çka d.m.th. se nuk reagon më doza fillestare). Përdoruesi duhet shtuar dozat e përdorimit për ta arritur efektin e mëparshëm. Kjo quhet Tolerancë.

Në përgjithësi opiatet kanë veprim të ngjashëm në përjashtim të heroïnës e cila shkakton efekte më të fuqishme prandaj edhe është opiat që gjenë keqpërdorim më të madh.

Historiku i Heroïnës

Heroïna së pari është sintetizuar në vitin 1897 nga kimisti Anglez C.R. Hoffman në laboratorin farmaceutik të Bayerit. Në këtë laborator janë bërë edhe studimet mbi aspirinën. Heroïna dhe aspirina janë përpunuar nga i njëjti proces kimik.

Fillimisht heroïna është menduar se është më pak adiktive sesa opiatet tjera. Në fund të shek. XIX-të dhe në fillim të shek. XX -të, heroïna është përdorur për qëllime mjekësore ndërkah në vitin 1924 bëhet drogë ilegale në SHBA. Në gjysmën e dytë të shek. XIX-të, heroïna njihet si substancë me efekte të dëmshme dhe imazhet e disa përoruesve të varur nga heroïna janë propaganduar përmes mediave.

Në vitet e 60 -70-ta heroïna ka marr karakter epidemiologjik në Evropë. Në Kosovë deri në vitet e 70 -ta nuk ka qenë i raportuar asnjë rast i përdorimit të heroïnës. Në vitin 1985 janë shënuar 71 raste të përdoruesve të heroïnës. Por nga viti 1985 deri në themelimin e Qendrës Labirint në vitin 2002 ka pas mungesë të evidentimit të rasteve të përdorimit të heroïnës. Pas vitit 1999 fenomeni i përdorimit të heroïnës fillon të marr karakter epidemiologjik edhe në vendin tonë.

Përkrahja e Heroïnës

Heroïna është opium gjysmë-sintetik, e cila përfitohet nga morfina. Heroïna gjendet në formë të pluhurit me ngjyrë të ndryshueshme, kafe të errët, të kuqërremt dhe në formë të pluhurit të bardhë (e cila është e pazakontë në Kosovë).

Heroïna së pari është prodhuar në Kolumbi Meksikë, Azi dhe veçanërisht në Burma dhe Afganistan.



Heroína mund të përdoret:

- **Përmes injektimit intravenoz:** përdoruesit zgjedhin këtë rrugë për arsye se marrin sasi më të vogël se sa përmes rrugëve tjera. Përmes injektimit intravenoz heroína absorbohet shpejtë në gjak dhe menjëherë vepron në tru.

- **Përmes nuhatjes:** heroína në formë të pluhurit nuhatet përmes vrimave të hundës. Absorbimi i saj bëhet përmes mukozës së hundës dhe kalon në gjak. Është formë mjaftë e shpeshtë e përdorimit.

- **Përmes tymosjes:** përmes folisë dhe cigares, e cila arrin në tru për 7 sekonda. Përjetimi i kulmit të efektit zgjatë pak, pasi një pjesë e heroinës digjet gjatë procesit të oksidimit.

- **Përmes gëlltimit:** është formë e rrallë e përdorimit. Zakonisht aplikohet ku përdoruesit nuk duan të zbulohen nga ana e policisë. Arritja e efektit të heroinës përmes gëlltimit është më e ulët pasi i nënshtrohet procesit të gjatë të metabolizmit në organizëm.

Rreziku i varësisë nga heroína është i njëjtë për të gjitha këto forma të përdorimit. Injektimi intravenoz i heroinës paraqet rreziq më të lartë për mbidozim, infeksione HIV-Aids, Hepatit B dhe C dhe dëmtim të rëndë të venave.

Përbërja Kimike dhe Farmakologjia

Emri kimik i heroinës është Diacetylmorphine. Heroína përfitohet nga boça e njomë e bimës Opium Poppy. Boça prehet tërësisht, nga e cila nxirret lëngu i opiumit, ku në kontakt me dritën dhe ajrin ngurtësohet dhe marr formën e rrëshirës me ngjyrë kafe të errët. Opiumi i fituar përmaban koncentrim të lartë të morfines. Nga opiumi ndahet morfina e cila është substancë natyrale. Me anë të acenit të morfines, që është një proces i thjeshtë kimik nxirret heroína.

Heroína ka veprim të shpejtë dhe të fuqishëm në organizëm. Kalon shumë shpejtë barrierat e qelizave dhe ndikon në tru. Organizmi pas përdorimit të heroinës reagon me vrull të intenzitetit të lartë. Heroína ka veprim më të fort analgetik sesa morfina.

Dëmtimet Mjekësore

- **Mbidozimi (Overdoza):** Vdekja nga heroína mund të vie si rezultat i ndërprerjes së funksionimit të qendrës për frymëarrje, e cila gjendet afer qendrës trunore ku veprojnë receptorët e heroinës. Marrja e heroinës me doza të larta e bllokton funksionin e qendrës për frymëarrje dhe si rezultat mund të pasoj vdekja.

Faktorët që mund të ngrisin rrezikun për mbidozim janë:

- Përdorimi i heroinës me doza të larta nga ana e përdoruesve, të cilët e kanë ndërprerë për një kohë dhe i rikthehen duke e përdorur me sasi të njëjtë si në momentin e ndërprerjes.
- Heroína e cila gjendet në treg nuk ka cilësi të njëjtë. Për qëllime përfitimi ajo përzihet me aditiv tjerë të ndryshëm. Kjo i bënë përdoruesit që të mos kenë njohuri për cilësinë e marrjes së heroinës kështu që mund të marrin doza fatale.
Në vitin 2006 në SHBA kanë vdekur me qindra përdorues të heroinës pasi kanë përzier heroinën me fentanol që është një opium i sintetizuar.
- Përdorimi intravenoz paraqet gjithnjë rrezik të lartë për mbidozim për arsye të veprimt të shpejt dhe direkt të drogës në gjak. Përdoruesit shpesh me qëllim të mos dëmtimit të të venave tentojnë të marrin sasi më të madhe të heroinës, e cila mund të rezultoj në mbidozim.

Potenciali për Varësi

Një ndër aspektet me problematike të heroinës është se shkakton tolerancën rapide (të shpejtë) dhe varësin e lartë fizike dhe psikike.

Varësia fizike karakterizohet me shqetësimë ose pakënaqësi ekstreme në organizëm, simptomet e tërheqjes janë: nauzea, vështirësi në gjumë, insomni, barkqitja, mundim e djerstije dhe dhimbje të papërballueshme trupore dhe dëshirë e shtuar për ta përdorur përsëri.

Aspekti Ligjor

Heroína është drogë ilegale në të gjitha vendet e botës. Nuk ka përdorim mjekësor.

Doza dhe Toleranca

Heroína është një ndër opiatet që shkakton tolerancë rapide (të shpejtë). Dozat fillestare kanë tendencë rritje deri në 20 doza për muaj. Është debatuar gjatë rreth dozës e cila shkakton tolerancë. Howard Lotsof duke u bazuar në studimet dhe punën e tij 20 vjeçare mbi trajtimin e personave të varur nga heroína, ka vlerësuar se 1 mg Heroin jep efekt analgjetik në organizëm.

Infeksionet

Përdorimi i heroïnës si dhe drogave të tjera paraqet rrezik të madh për marrje të infeksioneve. Të dhënat statistikore kanë treguar se përdoruesit intravenoz të drogave janë grup i rrezikuar për t'u atakuar me infeksionet e Hiv-AIDS, Hepatitit B dhe C.

Dihet nga praktika se përdoruesit e drogave i shkëmbejnë shiringat me të cilët injektojnë drogën.

Një shiring mund të përdoret nga disa përdorues.

Shkëmbimi i shiringave ndodh si rezultat i mungesës së shiringave në momentin e marrjes së drogës, dëshirës së madhe për ta marr menjëherë, pamundësi për t'i bart vazhdimisht shiringat me vete si dhe frika se mos zbulohen nga policia. Shpesh ndodh kur përgatitet sasi e drogës në proporcion me numrin e përdoruesve dhe me të njëjtin shiring injektohet doza e caktuar nga ana e secilit përdorues.

Infeksionet mund të barten jo vetëm me anë të shiringut të përbashkët por edhe me anë të veglave për përgatitje të drogës siç janë: ena e cila mund të jetë pjesë metali, kapak, luga, , pambuku ose filteri i cigares etj.

Dëmtimi i Venave

Përdorimi i drogave përmes rrugës intravenoze shkakton dëmtimin e rëndë dhe humbjen e elasticitetit të murit të venave. Venat dobësohen shumë dhe vështirë mund të gjenden për injektim të sërishëm. Vendet injektuara janë të mavijosura.

Problemet Sociale

Heroina është drogë shumë adiktive (që shkakton varësi të shpejtë). Përdoruesit kanë vështërsi të mëdha për ta nderprerë përdorimin. Preokupim kryesor në jetën e tyre bëhet sigurimi i drogës.

Vëmendja e tyre është e përqëndruar në sigurimin e patjetërsueshëm të dozave ditore të drogës duke i neglizhuar obligimet dhe aktivitetet e tjera sociale. Kjo pastaj çrregullon marrëdhëniet normale në familje, me partner. Me shumë vështërsi e mbajnë vendin e punës. Humbja e besimit edhe në rrethin e gjerë social sjell degradimin gradual të tyre.

SINDROMA E ABSTENENCES (tërheqjes)

Sindroma e tërheqjes i referohet shenjave karakteristike dhe simptomave që manife-stohen si rezultat i zvogëlimit ose ndërprerjes së menjëhershme të drogës, e cila është përdor-rur për një kohë të gjatë dhe ka shkaktuar varësi fizike tek përdoruesit.

Tërheqja gjithashtu mund t'i referohet simptomave të varësisë psikologjike. Ndërprerja e menjëhershme e drogës shkakton lëkundje të ekuilibrit metabolik. Simptomat e tërheqjes përfshinë: nauzen, të vjellura, djersitje, dridhje dhe ankth.

Intensiteti i simptomave të tërheqjes varet nga lloji, doza, shpeshësia dhe kohëzgjatja e përdorimit të drogës. Çdo drogë karakterizohet me simptome të veçanta të tërheqjes.

Simptomat e tërheqjes që janë të përbashkëta për të gjitha drogat:

- Humbjen në peshë,
- Paranoja: është karakteristike e personave të varur nga drogat. Paranoja varet nga lloji i drogës. Drogat shkaktojnë dëmtime në sistemin nervor duke i çrregulluar ndijimet dhe percepti-met.
- Preukopime: përdoruesit e varur nga drogat preukopim kryesor kanë sigurimin e drogës. Tërë veprimtarinë e tyre e orientojnë në sigurimin e drogës duke u përfshirë edhe në vepra të jashtëligjshme si vjedhje, mashtrime e deri në veprime të rënda kriminale. Si rezultat i krejt kësaj çrregullohen marrëdhëniet me familjen dhe punën. Ju humb interesimi për ruajtjen e shëndetit dhe mbajtjen e higjienës personale.

Mbidozimi është proces fiziologjik, i cili pason pas përdorimit të dozave të tepruara të drogës duke i ngopur receptorët për të cilët lidhet droga. Sasia e drogës e cila mbetet pa u lidhur nga receptorët mbetet si drogë e lirë. Kjo sasi e mbetur e drogës lidhet për receptorët e qendrës për frymëmarrje me ç'rast bllokon funksionimin e qendrës për frymëmarrje.

Në përgjithësi dallohen dy lloje të mbidozimit. Mbidozimi varet nga sasia dhe lloji i drogës, përzierjet e drogave, gjendja momentale dhe e përgjithshme e organizmit të përdoruesit.

- **Mbidozimi**, ku përdoruesi bie në gjendje kome por nuk vdes. Kjo ndodh kur përdoruesi përdor sasi më të vogël të drogave se sa doza vdekjeprurëse. Përzierjet e drogave janë të atilla që nuk shkaktojnë ndryshime të pakthyeshme në organizmin e njeriut. Gjendja momentale dhe përgjithshme është e atillë që përballon gjendjen e krijuar të mbidozimit.
- **Mbidozimi vdekjeprurës** ndodh kur faktorët e lartpërmendur shkaktojnë ndryshime të pathyeshme në organizmin e përdoruesit.

Simptomet e Mbidozimit

- Frymëmarrje e ngadalësuar deri në ndalje të saj,
- Buzët dhe gishtërinjtë marrin ngjyrë të kaltër (mavijosen),
- Humbje e fuqisë,
- Përgjumje dhe vështërsi në kthjellje deri në humbje të vetëdijes,
- Lëkurë e ftohët,
- Rënie e shtypjes së gjakut dhe ngadalësim i të rrahurave të zemrës.

Simptomet e Mbidozimit Vdekje Prurës

- Ndalje e frymëmarrjes,
- Ndalje e qarkullimit të gjakut me humbje të pulsit,
- Ndalje e të rrahurave të zemrës,
- Vdekja.

Në të dy rastet e mbidozimit mund të kemi rënie me mbidozim të menjëhershëm dhe të ngadalshëm.

Mbidozimi mund të jetë i menjëhershëm ku brenda disa minutave përdoruesi mund të vdes. Në disa raste të tjera gjendja me mbidozim mund të zgjasë me orë të tëra.

Si nuk duhet vepruar

- Nuk duhet injektuar kripë të tretur me ujë,
- Mos injektoni asnjë substancë tjetër narkotike,
- Mos e vendosi personin në vaskë me ujë sepse mund të fundoset,
- Çaji, kafeja dhe alkooli nuk ndihmojnë në zgjimin nga mbidozimi,
- Mos e leni vetëm personin e mbidozuar.

Si duhet vepruar

- Vërteto gjendjen e vetëdijes duke e thirrur dhe lëkundur personin pa i shkaktuar lëndime.
- Kontrolllo frymëmarrjen e personit të mbidozuar, nëse është pavetëdije duke e ofruar veshin tek goja e tij ose duke shikuar ëvizjet e gjoksit dhe barkut,
- Nëse personi nuk merr frymë, atëherë liro rrugët e frymëmarrjes duke e kthyer në shpinë, pastro gojën dhe ngritë hartë mjekrrën e tij,
- Pasi t'i kenë liru rrugët e frymëmarrjes jep frymëmarrje artificiale,
- Pa humbur kohë kërkoni ndihmë profesionale (mjekun, ndihmën e shpejtë) dhe deri sa të vijë ndihma mos e leni vetëm kurrsesi personin,
- Deri sa të vijë ndihma ktheje personin në krahë, në mënyrë që të mos i bllokohen rrugët e frymëmarrjes.

Paraqitja e parë e rasteve të personave të varur nga droga, sidomos në Amerikë është konsideruar si problem mjekësor dhe si i tillë duhet intervenuar nga aspekti mjekësor. Mirëpo recidivizmi i shpeshtë ka treguar se ky tretman nuk është efektiv. Më vonë është vërejtur se përveç varësisë fizike, drogat shkaktojnë edhe varësi psikologjike. Në skenën e tretmanit paraqiten psikologët, të cilët gjithashtu nuk kanë mundur të japin rezultatet e duhura dhe nuk kanë arrit të shpjegojnë mekanizmin e varësisë psikike. Psikologët kanë bërë hulumtime të shumta për përcaktimin e personalitetit të predisponuar për varësi nga drogat por nuk kanë arrit ta shpjegojnë deri më sot.

Sociologët duke analizuar karakterin epidemiologjik të përhapjes së drogave kanë bërë përpjekje të intervenojnë me qasjen sociologjike ndaj fenomenit të drogave si problem shoqëror. Me gjithë përpjekjet e bëra rezultatet ishin të vogla. Vlera e këtyre hulumtimeve mbetet në nivelin e përshkrimit të fenomenit.

Lidhur me problemin e varësisë nga drogat dhe kriminalitetin kanë bërë ndërhyrje edhe penologët me qasjen e tyre e cila ka propaganduar se izolimi i përdoruesve të drogës për një kohë të caktuar jep efekte pozitive. Burgu është konsideruar si zgjidhje me e mirë për tretman. Shpejtë është kuptuar se kjo ide duhet braktisur.

Në vitet e 80-90-ta është parë se problemi i varësisë së drogave ka karakter multidisiplinar dhe duhet intervenuar nga pikëpamja multidisiplinare.

Në Kosovë nuk ka pasur ndonjë tretman specifik për trajtimin e përdoruesve të drogës, përveç tretmanit ambulator nga Klinika Psikiatrike në Prishtinë.

Kohëve të fundit në botë ofrohet një llojshmëri e gjerë dhe forma të shumta të tretmanëve duke filluar tretman mjekësor, psikoterapeutik, socioterapeutik, religjioz etj.

Tretman i Mjekësor

I gjithë tretman është i bazuar në tretmanet bazike duke u përpjekur që pacientët sa më lehtë ti përballojnë dhe kalojnë simptomat e tërheqjes, deri sa droga të tërhiqet nga organizmi.

Këto intervenime bazohen në të ashtuquajturin program Koktel ilaçesh që zgjatë 10 deri në 15 ditë.

Këto terapi janë të bazuara në ilaçe, të cilat zëvendësojnë drogat që duhet përdorur për një kohë të gjatë. Kjo terapi shpesh ka hasur në kundërshtitë nga ana e opinionit dhe profesionistëve tjerë, të cilët e kanë konsideruar si jo etike.

Kohëve të fundit është paraqitur një formë e re e detoxit (pastrimit) që quhet Rapid Detox (pastrim i shpejtë). Rapid Detox është metodë mjekësore e cila e pastron organizmin për një periudhë të shkurtër kohore prej 12 orësh. Kjo metodë bëhet nën anestezion të plotë të klientit.

Në fakt në dhjetë vjeçarën e fundit dhe atë në vendet e zhvilluara dominon Terapia Zëvendësuese.

Përvojat kanë treguar se janë programe të suksesshme dhe janë të rekomanduara nga OBSH (Organizata Botërore e Shëndetësisë), UNDOC (United Nations Office on Drugs and Crimes), EMCDDA (European Monitoring Center on Drugs and Drug Abuse).

Ekzistojnë tri lloje programeve zëvendësuese:

a. **Subotex (Buprenephine) Programi:** Buprenephine është preparat mjekësor, e cila ka veprim agonist dhe antagonist në organizëm. Veprimi agonist jep efektin e përafërt të drogës kurse veprimi antagonist –që i bllokon receptorët e heroïnës.

b. **Morfina me veprim të ngadalësuar:** është metodë zëvendësuese, ku klientit i jepet morfinë me strukturë paksa të ndryshueshme kimike me qëllim të qëndrimit sa më të gjatë në organizëm.

c. **Programet e Metadonit:** Metadoni ka filluar të përdoret në vitet e 50-ta në Amerikë, si ilaç për trajtimin e personave që kanë tentuar ta braktisin drogën. Metadoni ishte i njohur sepse konsiderohej si drogë dhe me vështësi është përhapur përdorimi i tij për tretman. Mirëpo sot programet e metadonit janë të përhapura në tërë botën.

Programi i Metadonit për Detox: kjo është formë e programit tre mujor, që i ndihmon klientët që të pastrohen gradualisht nga drogat. Në fillim metadoni jepet në doza të larta dhe më vonë fillohet me zvogëlimin e dozës ditore në mënyrë që klienti sa më pak t'i vërej krizat e tërheqjes së drogës nga organizmi.

Gjatë përdorimit të metadonit klienti është në gjendje që t'i kryej të gjitha aktivitetet dhe obligimet e jetës së përditshme pa ndonjë problem të madh.

Programi mbajtës me metadon: për dallim nga programi i mëparshëm, ky program zgjatë më shumë, deri në gjashtë muaj e ndonjëherë edhe me vite.

Është program i përshtatshëm e sidomos për personat që përdorin drogën për një kohë të gjatë e që prapun absolut ndaj krizave të tërheqjes e kanë shumë të ulët.

Përdorimi afatgjatë i metadonit gradualisht shkon duke zbehur dëshirën e përdoruesit për të përdorur heroinë. Në momentin kur klienti është i gatshëm ta braktis metadonin atëherë fillohet me zvogëlimin gradual të dozave të metadonit. Krahas këtij tretmani klientit duhet t'i ofrohet edhe përkrahje emocionale dhe profesionale.

Të dhënat statistikore kanë treguar se kjo formë e programit të metadonit ka dhënë efekte në uljen e përdorimit të heroines dhe braktisjen përgjithmonë të saj.

Programet e metadonit po ashtu kanë treguar edhe efekt parandalues dytësor pasi parandalon sjelljet e rrezikshme ndaj infeksioneve me HIV- Aids, Hepatit B dhe C.

www.rapitfulshqip.com

Terapia e Njohjes dhe e Sjelljes (Cognitive Behavioral Therapy): Ideja e terapisë së njohjes dhe sjelljes është se mënyra se si ndihen emocionalisht dhe si sillen njerëzit varet nga mënyra e të menduarit dhe jo nga ngacmimi i stimujve të jashtëm. Andaj njerëzit nuk mund t'i ndryshojnë rrethanat e jashtme por mund t'a ndryshojnë mendimet e cila pason me ndryshim të gjendjes emocionale dhe sjelljeve.

Qëllimi themelor i terapisë së njohjes dhe sjelljes në trajtimin e përdoruesve të drogës është të mundësohet e tyre në identifikimin dhe njohjen e situatave të cilat e shtyn të përdorin drogë dhe aftësimin e tyre me shkathtësi për t'u ballafaquar me problemet jetësore që mund ta shtyn personin të përdorë drogë dhe mundësinë e shmangies nga droga.

Ekzistojnë disa qasje të terapisë së njohjes dhe sjelljes:

- Qasja Racionale, Emotive dhe e Sjelljes (Rational Emotive Behavior Therapy)
- Terapia Dialektike e Sjelljes (Dialectic Behaviour Therapy)

Komponentet e terapisë së njohjes dhe sjelljes

- Analiza funksionale dhe
- Formimi i shkathtësive

Analiza Funksionale: këtu terapisti bashkë me klientin provojnë t'i identifikojnë mendimet, emocionet dhe sjelljet para dhe pasë përdorimit të drogave dhe njihen me rreziqet që e sjellin përdoruesin në rilaps (rikthim në përdorimin e drogës).

Analiza funksionale e shtynë klientin t'i gjejë shkaqet dhe rrethanat fillestare që e kanë shtyrë atë të përdor drogë.

Formimi i Shkathtësive: terapia e njohjes dhe e sjelljes tenton t'i mësojë ose ta aftësojë klientin me shkathtësi të përshtatshme dhe produktive ndaj ballafaqimit me situata të vështira jetësore. Terapisti përdor teknika për t'ia çmësuar sjelljet e papërshtatshme të klientit. Inkurajon klientin dhe e motivon për ndryshimin e mënyrës së të menduarit të pa arsyeshëm dhe zëvendësimin e tyre me mendime të arsyeshme. Tenton ta aftësojë klientin që të përballet me situatat, të cilat e shtynë drejt përdorimit të drogës.

Terapia e njohjes dhe e sjelljes është e strukturuar dhe kohëzgjatja e saj është 12 deri në 16 seanca terapeutike. Efektiviteti i terapisë së njohjes dhe sjelljes është më i fuqishëm kur kombinohet me terapi mjekësore. Suksesi i saj varet edhe nga personaliteti i përdoruesit.

TRETMANI I BAZUAR NË ABSTENENCË (tërheqje)

Historiku

Rehabilitimi Rezidencial: ky trajtim ka ekzistuar para dyzet vitesh. Rehabilitimi rezidencial është i njohur edhe si Komunë Terapeutike. Qëllimi i rehabilitimit rezidencial është rritja e nivelit të përgjegjësisë personale dhe sociale të klientëve.

Ky tretman ndryshon nga trajtimet tjera. Qëllimi i rehabilitimit rezidencial është mbajtja e përdoruesve të varur në ambient larg drogave. Klientët gjatë periudhës së tretmanit qëndrojnë larg ambienteve destruktive, ku mundësitë për të përdorur drogë janë më të mëdha. Trajtimi rezidencial tenton t'i vetëdijesoj klientët që qëndrojnë aty ta njohin jetën pa përdorim të drogave.

Gjatë qëndrimit në rehabilitimin rezidencial klientët aftësohen me shkathtësi sociale emocionale, në mënyrë që të jenë në gjendje të ballafaqohen me problemet të cilat u dalin pas përfundimit të këtij trajtimi.

Rehabilitimi Rezidencial ka dhënë rezultate të dukshme në zvogëlimin e përdorimit të heroïnës, kokainës e po ashtu edhe në zvogëlimin e sjelljeve kriminale.

Grupet e Vetë-Ndihmës: Ky grup përfshinë personat që kanë problemin e varësisë së drogave.

Grupi nuk është i udhëhequr nga profesionistë. Në fillim mësojnë rregullat se si duhet organizuar rrjedha e kësaj teknike. Mësojnë për rregullat e bashkëpunimit në grup, respektimi dhe besueshmërinë e njëri-tjetrit. Në grup krijohet atmosferë, ku klientët mund të flasin dhe të shprehin lirshëm emocionet lidhur me përvojat e tyre që lidhen me varësinë nga drogat. Qëllim i mbledhjes së grupit është dhënia e ndihmës së njëri-tjetrit për ta zgjidhur problemin e tyre të përbashkët. Klientët mund të mësojnë shumë nga përvojat e njërit tjetrit.

ZVOGËLIMI I DËMIT (harm reduction)

Zvogëlimi i dëmit-Qasja te injektuesit e drogave

Zvogëlimi i Dëmit (Harm Reduction) është koncept i Shëndetit Publik drejtuar parandalimit ose zvogëlimit të dëmeve shëndetësore të mundshme që vijnë si pasojë e sjelljeve të rrezikshme dhe që ndikojnë në shëndetin e njeriut sikur që janë marrja e infeksioneve HIV, Hepatit B dhe C.

Grupet që konsiderohen si grupet që kanë sjellje të rrezikshme janë: përdoruesit intravenoz të drogave që injektojnë, punëtorët e seksit komercial dhe meshkujt që kanë seks me meshkuj etj.

Tek injektuesit e drogave komponentë e Zvogëlimit të Dëmit është intervenimi, që qellim të përgjithshëm ka parandalimin e transmetimit të HIV-it dhe infeksioneve tjera që vijnë si pasojë e ndarjes së mjeteve të përbashkëta të injektimit në mesin e përdoruesve të drogës.

Pse është i rëndësishëm zvogëlimi i dëmit

- Ripërdorimi dhe përdorimi i përbashkët i shiringave si dhe mjeteve të tjera gjatë përgatitjes për injektim të drogës është mënyrë me rrezikshmëri të lartë të transmetimit të HIV-it. Sot në botë janë 2-3 milion ish përdorues dhe injektues të drogave që jetojnë me HIV/AIDS, dhe në më shumë se 110 vende raportohet për infeksionin HIV që vjen si pasojë e injektimit të drogave.
- Përhapja e virusit HIV në mesin e injektuesve në mungesë të aktiviteteve të Zvogëlimit të Dëmit për 1 deri në 2 vite arrin nivelin deri në 40 %.
- Infeksioni HIV përveç transmetimit përmes përdorimit të shiringave të njëjtë dhe të papastër përhapet edhe përmes marrëdhënjëve seksuale në mesin e injektuesve të drogave si dhe tek partneret e tyre. Prandaj Zvogëlimi i Dëmit bën parandalimin e mundshëm të infeksionit HIV si tek injektuesit e drogave po ashtu edhe tek popullata e përgjithshme.
- Intervenimet që bëhen te injektuesit e drogave me qëllim të zvogëlimit të rrezikut për transmetimin e HIV-it gjithashtu kanë potencial të angazhimit të injektuesve të drogave në shërbimet që ofrojnë tretmanë për varësi nga drogat që në fund të fundit i shpie injektuesit e drogave në abstinencë. Përfundimisht programet e tilla ndihmojnë në mënjanimin e pasojave të dëmshme që vijnë nga përdorimi i drogës duke përfshirë edhe infeksionin e Hepatitit B dhe C si dhe mbi-dozimin që mund të përfundojë me vdekje.

Qëllimet primare të Zvogëlimit të Dëmit janë zvogëlimi i pasojave negative shëndetësore të injektuesit e drogave si dhe të përmisojnë statusin shëndetësor dhe social të tyre. Dhe në fund, qasja e Zvogëlimit të Dëmit bën të njohur se për shumë përdorues të drogave tërheqje e plotë nga substancat psikoaktive në kohë të shkurtër është e pa realizueshme (pamundëshme), kështu që synim i Zvogëlimit të Dëmit është që t'iu ndihmoj injektuesve të drogave t'i zvogëlojnë injektimin e shpeshtë dhe të rrisin sjellje për injektim të sigurt.

Në vazhdim janë disa programe që kanë potencial të rëndësishëm në zvogëlimin e sjelljeve individuale të rrezikshme që kanë të bëjnë me injektuesit e drogave.

Programet për shkëmbim të shiringave

Programet e tilla synojnë të sigurojnë që ata përdorues të drogave që vazhdojnë të injektojnë të kenë qasje në mjete të pastërta apo të papërdorura për injektim, që përfshijnë shiringat, gjilpërat, filterat, enën për zierje etj.

Ekzistojnë intervenime specifike që njihen si "Programet për shkëmbim të shiringave", ku përdoruesit e drogave furnizohen me shiringa të sterilizuara dhe ju merren shiringat që i kanë përdorur.

Programet e tilla gjithashtu shërbejnë edhe për informata tjera me qëllim të angazhimit të përdoruesve të drogave në tretmanë për shërim.

Programet Zëvendësuese

Programet Zëvendësuese përfshijnë tretmanë të mbikëqyrur me medikamente për personat që janë të varur nga opiaidet. Bëhet zëvendësimi i drogës me droga sintetike që përdoren si ilaçe, sikurse është Metadon. Ndërsa qëllimi primar i tretmanëve zëvendësuese është abstinenca nga përdorimi i drogave ilegale. Sido që të jetë është fakt i qartë se programet mbajtëse të metadonit janë të rëndësishme në zvogëlimin e praktikimit të injektimit të rrezikshëm si dhe rrezikun e infeksionit HIV, për ata që janë në tretman. (Ky program është i sqaruar më në detaje te Llojet e Tretmanëve, shih më lartë.)

Këto tretmane fillimisht synojnë t'iu ndihmojnë përdoruesve të drogave që jetojnë me HIV/AIDS dhe të përballën me infeksionin. Tretmanët e tilla i përfshijnë përdoruesit e drogave që janë HIV pozitiv nën kujdesin shëndetësorë si dhe në programet me tretman anti-retroviral ku ju jepet mundësia t'iu adaptohen dhe të konsolidohen me sjellje të sigurta.

Tretmanët dhe kujdesi i personave që jetojnë me HIV/AIDS

Janë materiale informimi rreth trasmetimit të HIV-it përmes injektimit të drogave. Këto materiale ju japin informacione dhe ju ndihmojnë përdoruesve të drogave të menjanojnë ose zvogëlojnë mënyren e marrjes së drogave përmes injektimit. Përshkrimi i materialit rritet më shumë me përfshirjen e injektuesve të drogave në zhvillimin dhe dizajnimin e materialit.

Përmbajtjet e IEK materialeve (Informim, Edukim dhe Komunikim) përfshijnë rrezikun e injektimit si dhe praktikimin e ndarjes së shiringave, po ashtu përmban këshilla për zvogëlimin e dëmit. IEK materialet mund të shpërndahen përmes kanaleve të ndryshme duke u nisur nga kampanjat për vetëdijësim të përgjithshëm, furnizim me materialet përmes shërbimeve shëndetësore dhe sociale që frekuentohen nga përdoruesit e drogave, shpërndarjen e informative përmes moshatarëve (peer) dhe rrjetit të përdoruesve të drogave si dhe punëtorëve në terren.

Këshillim dhe Testim Vullnetar- është metodë e veçantë e komunikimit personal.

Ofron këshillim për zvogëlim të rrezikut si dhe këshillim për testim dhe këshillim të infeksionit HIV. Ekzistojnë qendrat për këshillim dhe testim vullnetarë që individëve ju ofrojnë këshillim para testimit pastaj testim për infeksionet HIV, Hepatit B dhe C si dhe këshillim pas testimit për zvogëlim të rrezikut.

Problemet e përgjithshme të zvogëlimit të dëmit (Harm Reduction)

Edhe pse Zvogëlimi i Dëmit kërkon që të dizajnoj politika dhe intervenime që të shërbej me programe specifike individuale dhe komunitetit në nevojë, megjithatë nuk ekziston ndonjë definicion ose formulë e posaçme për implementimin e Zvogëlimit të Dëmit.

- Përdorimi ilegal i drogave është pjesë e botës andaj duhet punuar në zvogëlimin e dëmit, se sa thjeshtë injorimin ose dënimin e tyre.
- Kuptimi i përdorimit të drogave është fenomen kompleks që përfshinë sjelljet nga abuzimi i rëndë deri në abstinencë totale, dhe njohuritë që disa mënyra të përdorimit të sigurt të drogave janë më të sigurta se sa disa tjera.
- Krijimi i jetës më cilësore individuale dhe asaj në komunitet si dhe mirëqenie për të gjithë përdoruesit e drogave si kriter për politika dhe intervenime të suksesshme.
- Të siguroj që përdoruesit e drogave dhe ata të cilët e kanë rutinë përdorimin e drogës të kenë ndikim në krijimin dhe dizajnimin e politikave dhe programeve që shërbejnë atyre.
- Qëllimi i Zvogëlimit të Dëmit nuk është intervenimi në ndërprerjen e përdorimit të drogës por vetëdijesimi për mënyrat e sigurta të marrjes së drogës, si që në mënyrë indirekte ndikon në parandalimin e përdorimit të drogës.

www.rapitfulshqip.com

DROGAT DHE KRIMINALITETI

Ekzistojnë disa lloj veprimesh kriminale që lidhen me drogat:

1. Veprimet kriminale që lidhen me substancat janë vepra kriminale që kanë të bëjnë me prodhimin dhe trafikimin e drogave. Këtu veprimi shpesh mund të kryhet edhe në përdoruesit që janë të organizuar në mjete kriminale, të njohura me emrin Narkokartela.

2. Veprimet kriminale nën ndikimin e drogave i atribuohen veprimeve kriminale varet shumë nga lloji i drogës së përdorur.

Personat nën ndikimin e stimulanteve mund të kryejnë veprime kriminale me agresivitet dhe arrogancë. Nën ndikimin e stimulanteve mund të kryhen edhe vrasje.

Personat nën ndikimin e depresantëve shfaqin pasqyrim abizitet për veprime të rrezikshme kriminale.

Përdoruesit nën ndikimin e substancave të halucinogjeneve mund të kryejnë vepra kriminale të pa qëllimit si parashikimi i të kaluarit të halucinacioneve.

3. Veprimet kriminale që lidhen me sigurimin e drogës i më së shumti veprime kriminale kryhen në këtë kategori. Qëllim kryesor i këtyre veprimeve kriminale është sigurimi i drogës. Këto veprime kriminale përfshijnë vjedhjet e imët, mashtrimet, placatjet, rrogatimet etj.

Të personalitetit me strukturë psikopatike dhe kriminelë që kanë shfaqur edhe problemat e drogës, shfaqin mundësi të për të kryer vepra të rrezikshme kriminale janë më të mëdha.

Ligjet pozitive nuk lehtësojnë dënimet për veprat të cilat janë shkaktuar nën ndikimin e drogës. Personi është përgjegjës për gjendjen që i ka shkaktuar vetes dhe për veprimet kriminale.

Për veprat kriminale me rrezikshmëri të ulët, u ofrohet mundësia e dënimit me masa alternative ku burgimi zëvendësohet me trajtimin efektiv.

Identifikimi i personit që përdor drogë është i vështirë, shpesh herë i pamundur, ose vlerësim i gabuar. Tek përdoruesit e rinjë deri në moshën 20 vjeçare, sjelljet e tyre ngjasojnë me krizat e adoleshencës. Natyrisht kjo varet shumë nga lloji i drogës, shpeshtësia, kohëzgjatja e përdorimit të saj dhe personaliteti i përdoruesit.

Përdoruesit fillestar të drogave vështirë identifikohen. Përderisa nga ana e profesionisteve dhe familjes identifikimi i personave që dikur ishin identifikuar si përdorues dhe pas braktisjes për një kohë të caktuar i rikthehen drogës sërish është më i lehtë.

Identifikimi i personave që i rikthehen drogës është më i lehtë sepse rifillojnë të përdorin doza me të larta dhe me të shpeshta (simptomat e varësisë shfaqen dhe mund të identifikohen me shpejt) krahasuar me dozën kur personi ka përdorur drogë fillimisht.

Ekzistojnë dy metoda për identifikimin i personit që përdor drogë:

Metoda psikologjike: përmes vështimit dhe vlerësimit të sjelljeve. Këto të dhëna sigurohen përmes anamnezës, hetero-anamnezës së tjetër dhe mënyrës së komunikimit, lëvizjeve, mimikës dhe shprehjes emocionale, tonit të zërit, stilit të jetuarit etj.

Metoda biologjike: përmes testeve që përcaktojnë prezencën e drogës në gjak dhe urinë. Testi i shpejtë (Rapid Test), është test që përmes urinës përcakton prezencën e drogës në organizëm, deri në ditën e gjatë pas përdorimit të drogës.

Prezenca e drogës në gjak: mund të përcaktohet edhe përmes metodave laboratorike, megjithatë kjo nuk ka përdorim të gjerë për shkak të pamundësisë së përcaktimit pas ditës së tretë të përdorimit. Mirëpo me anë të kësaj metode mund të përcaktohet sasia e prezencës së drogës në organizëm (analiza kuantitative).

Shpeshherë ndodh që gjatë procesit të tretmanit përdoruesit nuk i përmbahen tretmanit dhe përdorin drogë. Fillimisht, që do të thotë deri në tri herët e para të përdorimit, identifikimi i tyre përmes metodës psikologjike është jashtëzakonisht i vështirë, prandaj çdo herë tretmani përcillet me metodën biologjike të testimit.

Qasja dhe komunikimi ndaj personave që përdorin drogë

Qasja ndaj personave që përdorin drogë duhet të jetë qasje e bazuar në parime njerëzore. Zyrtari Sprovues duhet që punën e tij ta realizoj bazuar në etikën e tij profesionale. Pra qasja ndaj tyre është sikurse çdo qasje tjetër e cila nënkupton komunikim të mirëfilltë me klientin, qëndrim jo paragjykses, ta përdor empatinë (të bashkëndjejë problemin me klientin), t'i lejoj klientit hapësirë për t'i shprehur problemet e tij etj.

Ne punën me përdorues të drogës Zyrtari Sprovues duhet:

- Së paku të ketë njohuri elementare mbi drogat, llojet, efektet e tyre dhe trajtimin,
- Klientin duhet trajtuar në mënyrë humane, pa paragjykuar faktin e gjendjes së tij,
- T'i siguroj hapësirë për t'i eksploruar problemet e tij, ndoshta ato që lidhen me abuzimin e drogave.
- Zyrtari Sprovues duhet të orientohej në pozitivitet. Të mos e shoh personin vetëm si përdorues të drogës, por si njeri të cilit duhet ndihmuar që ta tejkaloj sfidën e varësisë nga droga.
- Duhet të përmbahet nga kureshtja personale. Zyrtari Sprovues duhet të jetë i kujdesshëm, sepse me stilin e të bërit pyetje mund ta pengoj procesin ose e kundërta mund të siguroj informata të cilat shkojnë në dëm për klientin. Informatat e siguruar nga klienti nuk duhet zbuluar.
- Zyrtari Sprovues me seriozitetin dhe vullnetin që i reflekton klientit duke krijuar ambient bashkëpunues arrin të krijoj marrëdhënie të shëndoshë profesionale me klientin dhe besueshmëri. Kjo e inkurajon klientin që të bëjë përpjekje për ta ndërpre përdorimin e drogave.

FJALORI NË ZHARGON TË RRUGËS

HALUCINOGENET

STIMULANTET

DEPRESANTET

ZHARGONI I PËRDORUESVE TË DROGËS

Ky fjalor shërben për ta kuptuar zhargonin e përdoruesve të drogës.

Njohja e këtij zhargoni besohet, se do të lehtësojë dhe mundësojë një komunikim të ndërsjellët midis zyrtarit sprovues dhe përdoruesit të drogës.

Gjate komunikimit me përdoruesit të drogave, është vërejtur se klientët shprehin me lirshëm përvojën e tyre emocionale, lidhur me problemin e varësisë së drogave, përmes zhargonit të tyre. Kjo ndodh për arsye se ata kanë:

- ndjenjë faji dhe turpi,
- varfëri në fondin e shprehjeve,
- për të siguruar komunikim të besueshëm me njeri tjetrin si dhe
- për shkak të përvojësimit të subkulturës së përdoruesve të drogës.

Njohja sa më e mirë e këtij zhargoni, nga ana e zyrtarit sprovues nënkupton një qasje më të lehtë dhe më të besueshme ndaj klientit.

MARIHUANA



Të gjitha emërtimet dhe shkurtesat që kanë të bëjnë me Marihuanën

Marihuana:

Që nënkupton fjalën efekt ose ndikim:

Fryti, lulja e Marihuanës:

Cigare e përgatitur, mbështjeallur:

Ndreqim ose përgatitim:

Pirja , Tymosja:

Cigarja:

Pako ose qese Marihuanë:

Filteri:

Që ka kuptimin e fjalës hejmë:

Gjendje, Disponim (mbyllje ne vete):

Letrat për përgatitjen e cigares:

Farat e Lules:

Që nënkupton indentifikim e përdorusit:

Rabi, Bari, Rabente, Tagji, Gjellbersir.

Gips, Fele, Skip, Skip.

Heda, Duqa.

Kuqis, Cplif, Toingj, Jint, Gjoll.

Rorillim, Rollitim, LLeppshtim, Pshtjellim.

Reng, Ngreh, Pecim, Cepim, Pina, Ipim.

Racige, Ragice, Rigace, Ricage.

Sepshe, Pesshe, Kese, Seke.

Lifter, Filter.

Rykim, Kyrim, Lebim, Rromim, Kryjke.

Stondirat.

Rizlla, Telra, Fleta, Qebe, Pshtjellse.

Rafa, Fara.

Gipser, Ckiper.

Fjalori në Zhargon të Rugës

LSD-a



Të gjitha emertimet dhe shkurtesat që kanë të bëjnë me LSD-në

LSD:

Acid, Cid, Bicikell, Cibikell, Hofmanka, Trip.

Mendime të thella:

Shumë fell, llof.

Halucinacione:

Haluh, Caluh.

Përjetim:

Të.

Gjendje, disponimi jo e mirë:

Faktapit.

Që nënkupton shkuarjen, ecjen:

Cejim, Ecim, Ikim, Pecim, Joshkim.


Vendi (te i njëjti vend):

Veni, Nevi.

Që nënkupton fjalën në rrjedhë (në ngjarje):

Jasht, Dal, Ik, Kijat, Cej.

EKSTAZI



Të gjitha emërtimet dhe shkurtesat që kanë të bëjnë me Eksatazi-në

Ekstazi:

Nën efekt, Ndikim:

Ndjenjë e këndshme:

Gjendje e lartë disponimi:

Shumë:

Gëlltitja e tabletës:

Marrja me hundë:

A je nën ndikim:

Që nuk është nën ndikim:

Bomboni, Bomboni

Mbi Kap, Faj, Vok

Leqsh

Konj, Qanweahug

Shale

Jagim, Gjigim, Krima

Shmëkatim, Copetona

A je, Gips, Chip

Dwell, Street, STR, Sy Zhardhu

KOKAINA



Të gjitha emërtimet dhe shkurtesat që kanë të bëjnë me Kokainën

Kokaina:

Mënyra e përdorimit:

Që nënkupton posedimin:

Ndikimi ose efekti:

Ndikim rrëqethës:

Sasia e përdorimit:

Mjet për marrje me hundë (fyshti):

Që e përshkruan gjendjen e njerëzshpirtërore:

Shitësi, Poseduesi:

Nekokë, Gumi e Bë, Qaqë, Koke

Kokainë, Kokainë, Kokainë, Kokainë, Kokainë

Ale, Ale, Ale, Ale, Ale, Ale

Mik, Mik, Mik, Mik, Mik, Mik, Mik, Mik, Mik, Mik

Ngjash

Esoset, e vocet, Mim, Mim

Kavall, Llakav, Fusha, Fusha

High

Lideti, Dilleri

HEROINA



Të gjitha emërtimet dhe shkurtesat që kanë të bëjnë me Heroinë

Heroinë:

Ndikimi ose efekti:

Krizat e Abstinencës:

Që nënkupton varësinë:

Shiringë:

Overdozë:

Që është në trajtim:

Që nuk e përdor një kohë:

Që nënkupton përdorimin e heroines:

Që nënkupton blerjen:

Doza më e vogël e heroines:

Përgatitja për përdorim:

Që nënkupton shitjen (sa e ka çmimin)



Të gjitha emërtimet dhe shkurtesat që kanë të bëjnë me SHPK-në

ShPK-ia:

Pistoleta:

Vjedhje ose grabitje:

Që nënkupton largimin e gjërave jo legale:

Që nënkupton mos përdorimin e gjestev për
tu vërejtur nga policia:

Që është falë (pa pagesë):

Që nënkupton vjedhje të fshehta (pa u vërejt):

Që nuk e përdor një kod:

Para (monedhë):

Kilogram:

Doza ma e vogël e heroïnës:

Lapileja, Kupçia, Jari, Xie

Tulla, Pjeter

Lapçun, Pjeter, Jashim, Krasim,
Nur, Anahit, Pjeter

Mar, Benen, Lartçe, Jari, Shmela,
Lartçe, Zhdike, Mahela

Mos u lapa, Rapllari, Mera, Lartçe, Qeli

Pjeter, Lartçe, Pjeter

Pjeter, Pjeter

Joni, Vllari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari,
Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari, Jari

Kel, Ripe, Lek, vika

Lartçe, Kili

Sepçe, Pjeter, Kesi, Doe

Ky doracak është përpiluar dhe përgatitur nga stafi i „Labirintit”:

Safet Blakaj, Defektolog
Arife Vesealaj, Psikologe

Dafina Muçaj, Psikologe
Rexhë Ahmetaj, Peer Educator (Dizajn)
Arsim Murtezi, Peer Educator

Një falenderim i veçantë për këshillat dhe sugjerimet :

Dr. Milazim Gjocaj, Dren Rexha, Ardian Klaiqi dhe Skënder Safqiu.

Botimi i këtij manuali u mundësua nga “UNICEF” Prishtinë

www.rapitfulshqip.com



Ky dokument është prodhuar me përkrahje të UNICEF-it. Pikëpamjet e shprehura në të në asnjë mënyrë nuk reflektojnë qëndrimin zyrtar të UNICEF-it.



qendra mediko-psikoterapike

LABYRINTH

Rr. Taslixhe 1/50, Prishtinë

Tel: ++377 44 131409; ++38138 517240

Email: labirinti@hotmail.com; labirinti@gmail.com

Designed by:

LIQUD studio

06-44473334

06-44473334